



**OFERTA PERSONAL ESTATUTARIO 2025**  
**Enfermero/a**

**2º EJERCICIO: PARTE ESPECÍFICA**

**INSTRUCCIONES:**

- 1.- No abra ni lea el interior de este cuadernillo hasta que se le indique.
- 2.- Esta prueba consiste en un cuestionario eliminatorio sobre el contenido de la parte específica del programa, de 100 preguntas tipo test con 10 de reserva (las 10 últimas, de la E101 a la E110), que deberán ser contestadas entre los números **E1** y **E110**, en el cuerpo principal de la "FOLLA DE RESPONSTAS".
- 3.- El tiempo total de realización del ejercicio es de **150 minutos**.
- 4.- Todas las preguntas tienen cuatro respuestas alternativas, siendo una la correcta. Las respuestas correctas sumarán **0,50** puntos, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán **0,125** puntos.
- 5.- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "FOLLA DE RESPONSTAS" es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
- 6.- Este cuestionario debe utilizarse en su totalidad como borrador de las respuestas elegidas, para no marcar una respuesta hasta estar totalmente seguro/a.
- 7.- La respuesta correcta se marca con una **X** bien hecha dentro de los límites del recuadro. De tener que anular alguna respuesta, el recuadro de la respuesta que se marcó erróneamente tiene que rellenarse por completo.  
  
Una vez que se anule, ya no podrá recuperarse de nuevo dicha opción de respuesta.
- 8.- Al finalizar su ejercicio, en el supuesto de que no tenga que realizar el examen de lengua gallega, adviértalo a la organización para su recogida. Debe entregar la "FOLLA DE RESPONSTAS", en el lugar que le indique la organización, donde le entregarán la última hoja autocopiativa. Al abandonar el recinto NO podrá llevar ningún cuestionario de preguntas. El Servicio Gallego de Salud facilitará el acceso a los mismos a través de la página web: [www.sergas.es](http://www.sergas.es), después de finalizados los tiempos de examen.  
Si tiene que realizar el ejercicio de lengua gallega, permanezca en su lugar. Al finalizar su ejercicio, guarde este cuestionario en el suelo, bajo su asiento y espere las indicaciones para realizar a continuación el otro examen, en unidad de acto.

**LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN EL REVERSO DE LA  
HOJA DE RESPUESTAS PARA SU CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN**

**EXAMEN EN CASTELLANO**

**1. En un paciente con trastorno bipolar a tratamiento con sales de litio. ¿Qué debemos tener en cuenta?**

- A) La reducción del sodio en la dieta aumenta el riesgo de intoxicación por litio.
- B) El paciente debe tener una restricción hídrica en su dieta.
- C) Se recomienda una dieta hiperproteica.
- D) El alcohol y la cafeína no están restringidos.

**2. Basándonos en los 5 momentos de la higiene de manos, cuando una enfermera entra en la habitación de un paciente para recoger la bandeja de la mesa auxiliar, sin tocar al mismo, que momento de los indicados debe poner en práctica:**

- A) No es necesaria la higiene de manos ya que no hay contacto físico con el paciente.
- B) Momento 1 al entrar y momento 4 al salir.
- C) Momento 1 únicamente.
- D) Momento 1 al entrar y momento 5 al salir.

**3. En relación a la mujer, en la Cartera de Servicios en atención primaria del Servicio Gallego de Salud, ¿qué servicio de los siguientes no está incluido en la misma?**

- A) Reclutamiento y valoración de la gestante.
- B) Visita en el tercer mes postparto.
- C) Información y seguimiento de métodos anticonceptivos.
- D) Vacunación contra la rubéola.

**4. ¿Cuál de estas escalas es un instrumento validado y ampliamente utilizado en el Servicio Gallego de Salud para medir la calidad de vida relacionada con la salud en mujeres durante la menopausia?**

- A) Escala Goreti.
- B) Escala Cervantes.
- C) Escala de Edmonton.
- D) Escala del reloj.

**5. Tal y como se recoge en el documento del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España sobre Estrategia Española de Salud Global 2025-2030, entre sus principios rectores se encuentra:**

- A) Enfoque de derechos humanos, con especial atención a los derechos sexuales y reproductivos.

B) One Health y salud planetaria.

C) Perspectiva feminista.

D) Todas las anteriores.

**6. En relación a la vacunación frente a la enfermedad neumocócica, según el calendario de inmunización a lo largo de toda la vida, actualizado el 15 de abril de 2024 (Programa gallego de vacunación), escoja la opción incorrecta:**

A) En el adulto, Prevenar 20® se puede administrar de forma concomitante con cualquier vacuna del calendario de inmunización a lo largo de toda la vida.

B) En la población adulta sin condiciones de riesgo, la vacuna conjugada con 20 serotipos (VNC20) se administrará como dosis única al cumplir los 65 años.

C) Todas las personas nacidas desde el 1 de enero de 1952 que no hubiesen recibido una dosis de vacuna conjugada con anterioridad deberán recibir una dosis de VNC20.

D) En el caso de personas nacidas antes del 1 de enero de 1952 que no hubiesen recibido con anterioridad alguna dosis frente al neumococo, no recibirán ninguna dosis de VNC20.

**7. De los siguientes agentes infecciosos, señale el que NO es una infección de transmisión sexual:**

A) Neisseria Gonorrhoeae.

B) Virus herpes simple 2.

C) Gardnerella Vaginalis.

D) Treponema Pallidum.

**8. Según el plan de parto y nacimiento que encontramos en los hospitales del Servicio Gallego de Salud, ¿qué tipo de ingesta se recomienda preferentemente a una embarazada durante el periodo de dilatación?**

A) Líquidos claros y bebidas isotónicas.

B) Dietas ricas en triptófanos, aminoácido esencial necesario para la producción de serotonina.

C) Lácteos y zumos con pulpa por la importancia de la fibra y el aporte de calcio.

D) Ayuno de sólidos y líquidos para evitar riesgos ante posibles complicaciones.

**9. Delia es una paciente a estudio por sospecha de EPOC en la que queremos valorar su disnea con la escala modificada del Medical Research Council (mMRC) y presenta una puntuación de 3 en dicha escala. Esta puntuación implica que:**

A) Tiene sensación de ahogo al andar en llano al mismo paso que otras personas de su edad y necesidad de parar a descansar.

- B) La sensación de ahogo la obliga a parar antes de los 100 metros o después de pocos minutos andando en terreno llano.
- C) Presenta sensación de ahogo al realizar esfuerzos del día a día como vestirse o salir de casa y necesidad de descanso.
- D) Esta no es una escala de valoración de la disnea.

**10. En relación a la escala APFEL y la predicción de náuseas y vómitos posoperatorios, ¿cuál de los siguientes es uno de los factores de riesgo contemplados en dicha escala:**

- A) Edad menor de 50 años.
- B) Tipo de cirugía.
- C) Uso de anestesia general.
- D) Estatus de no fumador.

**11. Según GesEPOC 2025, en el paciente con EPOC (enfermedad obstructiva crónica), ¿quién es paciente exacerbador?**

- A) Cualquiera con una o más agudizaciones graves o dos o más moderadas en el año previo.
- B) Cualquiera con una o más agudizaciones moderadas o una o más graves en el año previo.
- C) El paciente que siempre está con disnea.
- D) Ninguna de las anteriores opciones lo define.

**12. Según el proceso asistencial integrado diabetes mellitus tipo 2 (Actualización 2023), el seguimiento de la persona con DM2 bien controlada incluye lo siguiente, a excepción de una de las opciones, indíquela:**

- A) Determinación de glucemia y HbA1c en la revisión semestral.
- B) Determinación de peso, IMC, presión arterial y frecuencia cardíaca trimestralmente.
- C) Índice tobillo-brazo si se sospecha arteriopatía periférica y exploración de los pies cada tres meses.
- D) Exploración de las zonas corporales habitualmente empleadas para la administración de tratamientos inyectables (sí procede).

**13. Basándonos en el test de Apgar, ¿qué puntuación le darías al epígrafe de "esfuerzo respiratorio" si al realizar el test, el neonato presenta respiración lenta e irregular?**

- A) 0 puntos.
- B) No se puede puntuar si no se usa un fonendoscopio.
- C) 1 punto.

D) 2 puntos.

**14. Según el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia efectiva en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los:**

- A) 45 días a lo largo de cada año natural.
- B) 90 días a lo largo de cada año natural.
- C) 120 días a lo largo de cada año natural.
- D) 180 días a lo largo de cada año natural.

**15. Según la última actualización de las recomendaciones de vacunación frente a Monkeypox, señale la respuesta incorrecta:**

- A) La pauta de vacunación recomendada en preexposición es de dos dosis con un intervalo de al menos 28 días.
- B) La pauta de vacunación recomendada en posexposición es de una sola dosis. La pauta se completará con una segunda dosis en personas en las que se le recomienda la profilaxis preexposición y en aquellas que, habiendo pasado la enfermedad previamente, estén en situación de inmunosupresión.
- C) En el momento actual, se recomienda el uso preferente de la vía intradérmica (0.5ml). La vía subcutánea (0.1ml) se podrá utilizar en situaciones especiales que hagan más adecuada esta vía de administración.
- D) Para optimizar el aprovechamiento de la vacuna se recomienda la utilización de jeringas y agujas que minimicen el volumen muerto.

**16. Teniendo en cuenta la escala de Braden-Bergstrom, descrita en los protocolos del Servicio Gallego de Salud, ¿cuál de los siguientes items se clasifica como un factor extrínseco relacionado con la tolerancia de los tejidos?**

- A) La baja presión arteriolar.
- B) Fricción y cizalla.
- C) Nutrición.
- D) Edad.

**17. En informática, ¿Qué es la interfaz de usuario?**

- A) El usuario que utiliza un ordenador.
- B) El teclado y el ratón de un ordenador.

C) Medio físico o gráfico, como pantallas, botones, iconos y menús, que permite la interacción y comunicación entre una persona y una máquina, software o dispositivo.

D) Ninguna es correcta.

**18. En relación a la indicación de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) en Galicia, elija la opción incorrecta:**

A) Vacunación sistemática a niñas y niños de 12 años con una única dosis.

B) CATCH-UP (rescate) de varones nacidos desde el 1994 con la administración de 2 dosis con pauta(0-6) si tienen 26 o más años.

C) CATCH-UP (rescate) de mujeres nacidas desde el 1994 con la administración de 1 dosis si tienen menos de 26 años.

D) Hombres hasta los 45 años, que tienen relaciones sexuales con hombres con pauta de 1 dosis, si son menores de 26 años o 2 dosis (0- 6 meses) se tienen 26 o más años.

**19. En relación a la Hepatitis B (VHB), señale la respuesta incorrecta:**

A) Alrededor del 50-70 por ciento de los pacientes con infección aguda por VHB presentan una enfermedad leve subclínica que generalmente pasa desapercibida.

B) La transmisión viral puede producirse mediante transmisión vertical madre-hijo o mediante transmisión horizontal.

C) Anti-HBs es el único marcador positivo en pacientes vacunados.

D) El virus de la Hepatitis D (VHD) requiere la presencia del AgHBs del VHB para penetrar en los histiocitos, por lo que solo puede infectar a pacientes que ya presentan VHB.

**20. Según el Plan de Asistencia al Ictus en Galicia, existen una serie de criterios de inclusión y exclusión a la hora de realizar la fibrinólisis intravenosa con el Activador del Plasminógeno Tisular Recombinante (rtPA). De los siguientes, ¿cuál no es un criterio de exclusión?**

A) Cifras mantenidas de tensión arterial sistólica (TAS) mayor de 185 mmhg o tensión arterial diastólica (TAD) mayor de 110 mmhg antes de la infusión del rtPA, a pesar del tratamiento antihipertensivo.

B) Pericarditis, endocarditis bacteriana, síndrome aórtico agudo.

C) Tratamiento con antagonistas de la vitamina K e INR mayor de 1,7 o tiempo de protombina mayor de 15 segundos.

D) La utilización de heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas en las últimas 24 horas.

**21. Según el proceso asistencial integrado para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre las recomendaciones previas a la realización de una espirometría, no se encuentra:**

A) No realizar ejercicio físico vigoroso (por lo menos 24 horas antes).

B) No administrar en las 6 horas previas broncodilatadores de acción corta: salbutamol, terbutalina, ipratropio.

C) No es necesario el ayuno, se evitará comidas abundantes (2-3 horas antes).

D) Se evitarán en lo posible bebidas estimulantes (café, té, refrescos cola...) o depresores el día de la prueba.

**22. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio clínico para declarar la muerte encefálica?**

A) Test de Apnea positivo: PaCO<sub>2</sub> menor de 60mmhg o aumenta más de 20mmhg sobre la PaCO<sub>2</sub> basal.

B) Abolición de reflejos oculovestibulares.

C) Abolición del reflejo oculocefálico.

D) Abolición del reflejo corneal.

**23. En relación la hemoglobina glicosilada (HbA1c) elija la afirmación incorrecta:**

A) En el seguimiento de la persona con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), su determinación debe hacerse al menos cada 6 meses.

B) Una glucemia basal en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl y HbA1c mayor o igual a 6,5%, determinadas de manera simultánea en una única muestra, confirman el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.

C) La HbA1c mide el promedio de los niveles de glucosa en sangre de las últimas 2-3 semanas.

D) La HbA1c refleja la glucosa unida a la hemoglobina durante la vida útil del eritrocito.

**24. Indique cuál de los siguientes enunciados sobre el catéter Swan-Ganz es falso:**

A) La primera onda en aparecer es la de la Presión de Enclavamiento Capilar Pulmonar (PECP) o Presión Capilar Pulmonar (PCP).

B) Una vez colocado, la luz proximal queda a nivel de la aurícula derecha y la luz distal en la arteria pulmonar.

C) El balón debe quedar desinflado mientras está en la arteria pulmonar.

D) El balón se infla con 1,5 mililitros de aire.

**25. En atención al Programa gallego de vacunación y en relación a la vacuna frente al herpes zóster, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

A) Está indicada en personas de 18 o más años de edad con tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.

B) Se puede administrar a personas con antecedentes de herpes zóster.

C) Es necesaria una dosis de recuerdo a los 5 años.

D) La pauta de vacunación consiste en dos dosis, que se administran por vía intramuscular, con intervalo entre 2 y 6 meses entre las dosis.

**26. ¿Cuál de las siguientes técnicas se considera la maniobra de elección para el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)?**

A) Maniobra de Dix-Hallpike.

B) Maniobra de Pemberton.

C) Maniobra de Kocher.

D) Maniobra de Epley.

**27. Como herramienta de comunicación estructurada para garantizar la seguridad en el traspaso de información clínica del paciente, ¿cuál es el significado correcto de las siglas del modelo SAER?**

A) Síntomas, antecedentes, evaluación, resolución.

B) Situación, antecedentes, evaluación, recomendación.

C) Seguridad, alerta, evolución, respuesta

D) Situación, alergias, exploración, resultados

**28. En relación con el signo de Courvoisier-Terrier, señale la respuesta correcta:**

A) Dolor en la fosa ilíaca derecha con la hiperextensión pasiva o la flexión activa de la cadera derecha.

B) Dolor a la descompresión abdominal; es un signo de irritación peritoneal.

C) Presión en el punto máximo de dolor abdominal con un dedo mientras el paciente flexiona la cadera o levanta el tronco; si el dolor empeora, el signo es positivo.

D) Vesícula biliar palpable y no dolorosa en un paciente con ictericia obstructiva.

**29. Según la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2024 sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión, escoja la respuesta incorrecta:**

A) Se define la hipertensión como una PA sistólica en la consulta confirmada mayor o igual a 140 mmHg o una PA diastólica confirmada mayor o igual a 90 mmHg.

B) El consumo dietético de potasio, p. ej., al consumir dietas ricas en frutas y verduras, tiene efectos antihipertensivos y se puede asociar con un menor riesgo de ECV.

C) Una emergencia hipertensiva se define como una PA mayor o igual a 180/110 mmHg asociada a DOMH (daño orgánico mediado por hipertensión) grave, generalmente en presencia de síntomas.

D) Todas las opciones anteriores son correctas.

**30. En relación a la determinación del índice tobillo-brazo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

A) El índice tobillo-brazo se calcula dividiendo la presión arterial sistólica (PAS) máxima de cada extremidad inferior entre la PAS más alta de ambas extremidades superiores, obteniendo dos valores, uno por cada pierna.

B) Un valor en alguna de las extremidades inferiores de 0,91 – 1,30 es indicativo de enfermedad arterial periférica (EAP) moderada.

C) También se utiliza en pacientes hipertensos para descartar valvulopatías coronarias.

D) Está contraindicado en pacientes con fracturas antiguas de miembros inferiores.

**31. ¿Qué fármaco en dosis única sería el de elección para el manejo de los vómitos en un niño con gastroenteritis aguda, antes de introducir terapia de rehidratación?**

A) Metoclopramida.

B) Domperidona.

C) Paracetamol.

D) Ondansetrón.

**32. Los criterios para el ingreso de un paciente en HADO (hospitalización a domicilio) son los siguientes, a excepción de una de los siguientes opciones. Indique cuál:**

A) El paciente y su cuidador principal en el domicilio deben aceptar voluntariamente su ingreso en la unidad.

B) El paciente debe reunir siempre criterios de estabilidad clínica, aún cuando el ingreso en HADO sea con fines de cuidados paliativos.

C) Es imprescindible disponer de uno o más cuidadores principales identificados que se responsabilicen del paciente durante su ingreso, con el fin de detectar eventuales incidencias que requieran la actuación del equipo de HADO. En ocasiones, también se solicitará colaboración en la administración de algunos tipos de tratamiento.

D) Disponibilidad de un domicilio o centro residencial que reúna las condiciones mínimas de higiene y habitabilidad, para garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en condiciones de seguridad.

**33. ¿Cuál es la lesión característica de la Fiebre Botonosa Mediterránea?**

A) Eritema migrans.

B) Tache noir.

C) Signo de romaña.

D) Escara de Tsutsugamushi.

**34. ¿Cuál de las siguientes opciones agrupa correctamente los tres componentes clínicos de la tríada clásica de la Encefalopatía de Wernicke?**

- A) Demencia, dermatitis, diarrea
- B) Confusión mental, anomalías oculomotoras, ataxia de la marcha.
- C) Habla escandida, temblor intencional, nistagmo.
- D) Fiebre, rigidez de nuca, alteración del nivel de consciencia.

**35. En relación a la retinografía (indicación, técnica, imágenes), ¿cuál de las siguientes opciones es falsa?**

- A) Si el nervio óptico se encuentra a la izquierda de la imagen, esto implicaría que estamos examinando el ojo izquierdo.
- B) La fovea se encuentra en la zona central de la retina y en el centro de la misma está la mácula, que corresponde con la zona de máxima agudeza visual.
- C) En el paciente adulto con DM tipo II bien controlada se realizará estudio de fondo de ojo, preferiblemente retinografía, en el momento del diagnóstico y cada dos/tres años, salvo ciertos casos.
- D) En una retinografía con un fondo de ojo normal, el nervio óptico o papila se visualiza en las imágenes como una estructura redondeada y rodeada de un anillo de color anaranjado.

**36. ¿Cuál es el operador booleano que más amplía los resultados?**

- A) "NOT".
- B) "OR".
- C) "HI".
- D) "AND".

**37. Los cuestionarios de satisfacción del cliente miden el elemento:**

- A) Resultado.
- B) Proceso.
- C) Competencia profesional.
- D) Estructura.

**38. El proceso de deterioro físico y mental que acompaña al envejecimiento se conoce como:**

- A) Senectud.
- B) Senilidad.
- C) Gerontología.

D) Geriatría.

**39. Un paciente ingresa en el servicio de urgencias con una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno basal del 88 por ciento, presión arterial de 82/45 milímetros de mercurio, ruidos cardíacos muy apagados a la auscultación e ingurgitación yugular evidente. ¿Ante qué cuadro clínico nos encontramos?**

- A) Infarto agudo de miocardio.
- B) Taponamiento cardíaco.
- C) Crisis hipotensiva con edema agudo de pulmón.
- D) insuficiencia cardíaca izquierda descompensada.

**40. El enfoque filosófico que Florence Nightingale dio a la Enfermería se centra en:**

- A) La relación entre el paciente y el entorno.
- B) La relación entre el paciente y una enfermera.
- C) La relación entre el paciente y lo que ella denominaba los "campos verdes de energía".
- D) La relación entre el paciente y su estado de salud.

**41. De entre las siguientes manifestaciones clínicas, ¿cuál no es indicativa de deshidratación grave en el lactante?**

- A) Retraso del relleno capilar mayor 1,5 segundos.
- B) Pérdida de peso corporal mayor 10%.
- C) Depresión del nivel de conciencia.
- D) Piel fría y seca.

**42. En relación a la vacunación frente a la enfermedad neumocócica para la población infantil en Galicia, ¿cuál es la pauta de administración adecuada en la actualidad para la vacuna VNC20?**

- A) 4 dosis. A los 2,4,6 y 11 meses de edad, sin dosis de recuerdo.
- B) Una única dosis a los 4 meses, tras la administración de la dosis prenatal a la madre.
- C) Dos dosis. A los 2 y a los 4 meses; y una dosis de recuerdo a los 12 años.
- D) 3 dosis. A los 2,4 y 18 meses sin dosis de recuerdo.

**43. ¿Cuál de los siguientes fármacos antiarrítmicos se encuentra absolutamente contraindicado en un paciente que presenta un patrón electrocardiográfico tipo 1 de Brugada?**

- A) Amiodarona

- B) Digoxina.
- C) Adenosina.
- D) Flecainida.

**44. Según el protocolo "infección quirúrgica zero", ¿cuál de las siguientes prácticas tiene mayor impacto en la reducción de las infecciones de sitio quirúrgico durante el período intraoperatorio?**

- A) Aplicar profilaxis antibiótica sistémica hasta 48 h después de la cirugía.
- B) Control estricto de la temperatura corporal para evitar hipotermia intraoperatoria.
- C) Realizar la antisepsia del campo quirúrgico con povidona yodada en dos fases.
- D) Uso de apósitos impregnados con antibióticos sobre la incisión quirúrgica al finalizar la cirugía.

**45. Desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿cuál es la característica morfológica principal del complejo QRS durante un episodio de ritmo idioventricular acelerado (RIVA)?**

- A) Complejos QRS estrechos con una duración menor de 0,12 segundos.
- B) Complejos QRS anchos con una duración mayor de 0,12 segundos y abigarrados.
- C) Presencia obligatoria de alternancia eléctrica en el voltaje QRS.
- D) Complejos QRS precedidos siempre de un intervalo PR constante.

**46. ¿Qué término define la torsión de un asa intestinal sobre su propio eje mesentérico que genera una obstrucción mecánica estrangulante?**

- A) Invaginación o intususpección.
- B) Íleo paralítico.
- C) Vólvulo.
- D) Diverticulitis.

**47. ¿Cómo denominamos al paso del fármaco desde el punto de administración hasta la sangre?**

- A) Absorción.
- B) Distribución.
- C) Farmacocinética.
- D) Ninguna es correcta.

**48. ¿Cómo se denomina la intervención quirúrgica para el tratamiento de la otosclerosis?**

- A) Mastoidectomía radical.

- B) Miringoplastia.
- C) Timpanoplastia con drenajes.
- D) Estapedectomía o estapedotomía

**49. ¿Con qué nombre se conoce la plataforma tecnológica del SERGAS para el teleseguimiento de pacientes en el domicilio?**

- A) TELEA.
- B) ATENDE.
- C) VIXIA.
- D) Todas son falsas.

**50. Antes de canalizar una vía venosa tendremos en cuenta:**

- A) Tipo y tamaño de la vena.
- B) Tipo de solución que vamos a inyectar.
- C) Duración del tratamiento.
- D) Todas son correctas.

**51. El patrón de conducta tipo A, caracterizado por la competitividad y la hostilidad, es un predictor de riesgo para qué tipo de patologías:**

- A) Trastornos metabólicos.
- B) Enfermedades cardiovasculares.
- C) Enfermedades autoinmunes crónicas.
- D) Trastornos de la conducta alimentaria.

**52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas sobre el envejecimiento de los ojos?**

- A) Nunca se produce el astigmatismo en la ancianidad.
- B) La cantidad de secreción lagrimal aumenta mucho con la edad.
- C) Se reduce la elasticidad del cristalino, produciendo capacidad reducida de enfocar los objetos cercanos.
- D) Existe una capacidad desproporcionada para distinguir los objetos claros.

**53. ¿Qué son "las cinco Aes" características de la enfermedad de Alzheimer?**

- A) Apraxia, Agnosia, Amnesia, Afasia y Anomia.
- B) Agitación, Amnesia, Afasia, Ansiedad y Anomia.
- C) Apraxia, Agnosia, Anemia, Amnesia y Agitación.
- D) Apraxia, Agnosia, Amnesia, Afasia y Agitación.

**54. ¿Cuál de los siguientes principios, según la propuesta de Diego Gracia, forma parte de la ética de mínimos?**

- A) Ninguno, ya que los cuatro principios de la bioética son iguales y no se pueden jerarquizar.
- B) El de autonomía, por ser el que fundamenta el derecho al consentimiento informado.
- C) El de no maleficencia, centrado en no ocasionar daño, primum non nocere.
- D) El de beneficencia, ya que siempre es el principio de mayor rango en la atención de enfermería.

**55. La cefepima es una cefalosporina de:**

- A) Primera generación.
- B) Segunda generación.
- C) Tercera generación.
- D) Cuarta generación.

**56. En epidemiología, el número básico de reproducción de una infección ( $R_0$ ) es un indicador que mide la capacidad de una enfermedad infecciosa para propagarse en una población. Si en un brote detectado en un área sanitaria de Galicia el  $R_0$  es menor que 1 ¿qué evolución se espera de la enfermedad?**

- A) La enfermedad tenderá a desaparecer.
- B) La enfermedad se mantendrá de forma endémica con un número constante de casos.
- C) La enfermedad se convertirá en pandemia de forma inminente.
- D) El número de casos crecerá de forma exponencial hasta alcanzar la inmunidad de grupo.

**57. ¿Cuáles son los "5 correctos" para garantizar la seguridad del paciente en la administración de medicamentos?**

- A) Paciente, frecuencia, dosis, vía y lugar correctos.
- B) Paciente, dosis, hora, pauta y vía correctos.
- C) Paciente, medicamento, dosis, vía y hora correctos.
- D) Ninguna es correcta.

**58. El índice de Swaroop-Uemura es un indicador de la salud que mide la relación entre las defunciones de personas de 50 o más años y el total de defunciones. Si tras analizar los datos de un Área Sanitaria en Galicia obtenemos un índice del 90% ¿cuál es la interpretación correcta de este resultado?**

- A) El nivel sanitario es deficiente, ya que la mortalidad se concentra en personas mayores.
- B) Se asocia a un buen nivel sanitario, ya que la mayoría de las defunciones ocurren en edades avanzadas.
- C) Existe una alta tasa de letalidad en la población infantil del área sanitaria.
- D) La esperanza de vida al nacer ha descendido drásticamente en esa población.

**59. Señale la opción correcta. La dosis recomendada de fármaco administrado por vía endotraqueal:**

- A) Similar al administrado por vía intravenosa.
- B) Inferior al administrado por vía intravenosa.
- C) Generalmente, superior al administrado por vía intravenosa.
- D) Ninguna es correcta.

**60. En la administración de fármacos por vía subcutánea en el paciente terminal mediante infusores elastoméricos, ¿cuál de las siguientes combinaciones de fármacos tiene un alto riesgo de precipitación y, por tanto, deben evitarse en la misma mezcla?**

- A) Morfina y haloperidol.
- B) Metoclopramida y midazolam.
- C) Dexametasona y midazolam.
- D) Hioscina (buscapina) y morfina.

**61. ¿Con qué tipo de fractura se asocia el signo de Battle?**

- A) Fractura de vértebras lumbares.
- B) Fractura de fémur.
- C) Fractura de la base del cráneo.
- D) Fractura de escafoides.

**62. Según la guía de práctica clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días del SNS, señale la afirmación correcta sobre el cuidado, mantenimiento y uso de la palomilla (catéter) para uso subcutáneo.**

- A) Se debe realizar aspiración con jeringa previa administración de fármacos para comprobar que no estamos en vaso sanguíneo.

- B) El volumen máximo aconsejable para hidratación subcutánea son 3.500 ml por cada punto de punción en 24 horas.
- C) Preferencia por uso de palomillas de teflón o vialon en lugar de agujas.
- D) Tras la administración de fármacos es obligatorio el lavado del trayecto de la "palomilla" con 5 cc de suero fisiológico para no perder medicación.

**63. ¿Cómo se denomina al vendaje que mantiene inmovilizado el hombro y la articulación escapulohumeral?**

- A) Vendaje de Lampaut.
- B) Vendaje de Linmarck.
- C) Vendaje en ocho.
- D) Vendaje de Velpeau.

**64. Según la clasificación de las dietas terapéuticas hospitalarias, una "dieta de progresión" que se prescribe habitualmente en el postoperatorio, tras un periodo de ayuno, y que incluye agua, infusiones y caldos desgrasados se denomina:**

- A) Dieta líquida.
- B) Dieta semilíquida.
- C) Dieta blanda.
- D) Dieta famis.

**65. En el marco de la ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente, el secreto profesional:**

- A) Es exclusivo del personal facultativo.
- B) Cesa automáticamente cuando el paciente es menor de edad.
- C) Constituye un deber para toda persona que accede a los datos del paciente en ejercicio de sus funciones.
- D) Sólo afecta a la información verbal, no a la escrita en la historia clínica.

**66. ¿Cuál de los siguientes test no se utiliza en la detección de TCA (trastornos de conducta alimentaria)?**

- A) BULIT-R.
- B) ChEAT.
- C) EAT-26.

D) MNA.

**67. Según el listado oficial de enfermedades de declaración obligatoria (EDO) establecido en el Real Decreto 2210/1995, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (y sus actualizaciones posteriores) ¿Cuál de las siguientes patologías se clasifica legalmente como EDO?**

A) Rinovirus.

B) Carbunco.

C) Metapneumovirus

D) Adenovirus respiratorio.

**68. ¿Cuál de los siguientes parámetros analíticos no forma parte de la escala de Ranson para la valoración pronóstica de la pancreatitis aguda?**

A) Lactato deshidrogenasa (LDH)

B) Aspartato aminotransferasa (AST)

C) Amilasa sérica.

D) Glucemia.

**69. Cuando administramos nutrición parenteral, señale la falsa:**

A) Si la nutrición parenteral se agota, debemos colgar un suero fisiológico al 0,9% al mismo ritmo de infusión hasta la llegada de la siguiente nutrición, con el fin de mantener la vía permeable y evitar hipoglucemias.

B) Se debe administrar a ritmo constante con bomba de infusión para evitar complicaciones.

C) Se debe conservar en nevera y sacarla de la misma entre 30-60 minutos antes de su administración.

D) Como complicaciones metabólicas pueden ocurrir tanto hiperglucemia como hipoglucemia.

**70. Durante el seguimiento de un paciente integrado en el Programa de Mantenimiento con Metadona (PMM) del SERGAS, el personal de enfermería identifica signos de miosis extrema, bradicardia, somnolencia profunda y bradipnea. ¿Qué sospecha clínica y actuación inmediata de enfermería son correctas?**

A) Síndrome de abstinencia a opiáceos; se debe duplicar la dosis ordinaria de metadona de inmediato.

B) Intoxicación aguda por estimulantes; se debe administrar flumazenilo por vía intramuscular.

C) Intoxicación/sobredosis por opiáceos; se debe asegurar la vía aérea, avisar al médico y preparar urgentemente la administración de naloxona.

D) Efecto secundario normal del tratamiento a largo plazo; se debe pautar reposo en domicilio.

**71. En la administración de metrotexato a altas dosis como terapia antineoplásica ¿por qué es vital mantener el pH urinario superior a 7?**

- A) Para aumentar la absorción intestinal de fármaco.
- B) Para prevenir la toxicidad hepática aguda.
- C) Para evitar la precipitación de cristales de metrotexato en los túbulos renales y prevenir nefrotoxicidad.
- D) Para no eliminar por orina el fármaco antes de lo previsto y por lo tanto disminuir su eficacia.

**72. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la definición de enfermedad terminal según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)?**

- A) Pronóstico de vida limitado
- B) Presencia de síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes
- C) Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico.
- D) Presencia de enfermedad, avanzada, progresiva y curable.

**73. En la visita domiciliaria a un paciente, cree percibir una sobrecarga emocional en el cuidador principal, por lo que decide valorar al cuidador mediante la escala de Zarit. Al aplicar dicha escala obtiene una puntuación superior a 56. ¿Qué nos indicaría este resultado?**

- A) El cuidador presenta una sobrecarga intensa.
- B) La escala de Zarit no valora la sobrecarga del cuidador.
- C) El cuidador no presenta sobrecarga.
- D) La escala de Zarit tiene un valor máximo de 36 puntos.

**74. ¿Cuál de estas vitaminas es liposoluble?**

- A) Vitamina K.
- B) Vitamina C.
- C) Vitamina B1.
- D) Vitamina B12.

**75. En la extravasación de un alcaloide de la vinca aplicaremos:**

- A) Calor local e hialuronidasa.
- B) Frío local y dimetilsulfóxido.
- C) Calor local y tiotepa.

D) Frío local y tiosulfato sódico.

**76. ¿Cuál de las siguientes complicaciones a la hora de administrar nutrición enteral por sonda nasogástrica es mecánica?**

A) Obstrucción de la sonda.

B) Síndrome de Dumping.

C) Hiperglucemia

D) Neumonía por aspiración.

**77. En referencia al proyecto "Prevención de la infección urinaria relacionada con la sonda uretral en pacientes críticos ingresados en las unidades de cuidados intensivos" (ITU-ZERO), indique cual de los siguientes enunciados es correcto:**

A) Utilizar sonda uretral de forma rutinaria.

B) Realizar lavados vesicales de forma rutinaria.

C) No se deben usar antimicrobianos profilácticos en la inserción, mantenimiento o retirada de la sonda uretral.

D) Retirar la sonda uretral cuando no sea necesaria, valorando semanalmente su indicación.

**78. Estamos administrando Nutrición parenteral total a través de un catéter venoso central insertado en vena subclavia a un paciente y se detecta una obstrucción intermitente del flujo que cede cuando cambia de postura. ¿Cómo se llama este fenómeno?**

A) Síndrome de Maillard.

B) Síndrome de tope encerrado.

C) Síndrome de la vaina de fibrina.

D) Síndrome de Pinch Off.

**79. Dentro de las principales incisiones quirúrgicas, señale la afirmación FALSA:**

A) La incisión de McBurney es una incisión oblicua realizada en el cuadrante inferior derecho para apendicectomías.

B) La incisión de Kocher es una incisión subcostal derecha utilizada frecuentemente para cirugía de vía biliar.

C) La incisión de Pfannenstiel es una incisión transversa y arqueada realizada por encima de la sínfisis del pubis.

D) La incisión paramedial es la incisión de elección de urgencia debido a su rapidez de apertura y cierre comparada con la línea media.

**80. ¿Qué tipo de agujas se utilizan para canalizar/puncionar un implantable port-a-cath o reservorio subcutáneo?**

- A) Aguja tipo trocar, con bisel largo y cortante, para facilitar el atravesado de la piel.
- B) Aguja tipo butterfly (palomilla) con calibre fino, para minimizar el dolor.
- C) Aguja tipo Kirschner, con punta roma para no perforar la base metálica del reservorio.
- D) Aguja tipo Huber o Gripper, con bisel especial para evitar la fragmentación de la silicona.

**81. En la unidad de reanimación ha ingresado un paciente con un traumatismo craneoencefálico con una puntuación en la Escala de Glasgow de 7 lo cual indica que:**

- A) Se trata de un traumatismo craneoencefálico leve.
- B) Se trata de un traumatismo craneoencefálico moderado.
- C) Se trata de un traumatismo craneoencefálico grave.
- D) Se trata de un traumatismo craneoencefálico regular.

**82. En relación con los sistemas de notificación de incidentes en Seguridad del Paciente SINASP, señale la respuesta correcta:**

- A) Su finalidad principal es sancionar a los profesionales responsables del error.
- B) Sólo deben notificarse los incidentes que hayan producido daño al paciente.
- C) El objetivo del sistema de notificación es la mejora de la seguridad de los pacientes a partir del análisis de situaciones, problemas e incidentes que produjeron, o podrían haber producido, daño a los pacientes.
- D) Son sistemas de carácter exclusivamente administrativo.

**83. El fármaco utilizado para revertir una intoxicación por benzodiazepinas es, indique la respuesta correcta:**

- A) El flumazenilo.
- B) La naloxona.
- C) La atropina.
- D) La vitamina K.

**84. Indique que término se corresponde con la definición: Elemento situado en el centro de una serie de datos estadísticos ordenados de menor a mayor; esto es, el dato situado en el centro, que la divide en dos partes iguales, una por encima y otra por debajo de él.**

- A) Media.

B) Moda.

C) Mediana.

D) Desviación estándar.

**85. En relación con la higiene de manos, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señale la respuesta correcta:**

A) Cuando las manos están muy sucias, el procedimiento de elección es la desinfección mediante preparados de base alcohólica.

B) El uso de guantes puede sustituir la higiene de manos.

C) Cuando las manos están contaminadas pero no hay suciedad visible, el procedimiento de elección es el lavado de manos con agua y jabón.

D) La higiene de manos hay que realizarla antes del contacto directo con el paciente, después del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica limpia o aséptica, después de exposición a fluidos corporales y después del contacto con el entorno del paciente.

**86. De las siguientes afirmaciones en relación con el concepto de género, ¿cuál es correcta?**

A) Es una característica universal.

B) Es una circunstancia social que depende de las distintas culturas y creencias, define características emocionales, intelectuales y de comportamiento de las personas.

C) Batería de ideas y creencias que circulan socialmente y logran adquirir rango de realidad.

D) Es el primer agente de socialización con el que se relaciona el ser humano. Es en este entorno en el que la persona adquiere valores, creencias y formas de vida.

**87. Elija la respuesta incorrecta. Según el proceso asistencial integrado para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la educación terapéutica para el/la paciente diagnosticado de EPOC y/o su cuidador principal incluye:**

A) Abandono del consumo de tabaco.

B) Identificación de exacerbaciones.

C) Actividad física: aconsejar la realización de ejercicio físico como caminar unos 30 minutos diarios, bicicleta estática, ejercicios respiratorios o ejercicios de brazos. Los objetivos del ejercicio son: disminuir la sensación de ahogo, facilitar las actividades de la vida diaria y mejorar su estado de ánimo.

D) Vacunación: la vacuna antigripal reduce la mortalidad y el número de hospitalizaciones durante los períodos epidémicos, por lo que se les debe recomendar a todos os pacientes con EPOC. La vacuna frente al meningococo se debe ofrecer al/la paciente con EPOC.

**88. En base al catálogo de productos para la cura en ambiente húmedo del SERGAS y las guías de práctica clínica vigentes, señale la opción CORRECTA respecto al abordaje de las lesiones relacionadas con la dependencia (LRCD).**

- A) Ante una úlcera por presión (UPP) grado I, el producto de elección según el catálogo es un apósito de hidrocoloide grueso para amortiguar la presión.
- B) Los ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) están indicados para el desbridamiento autolítico de los esfacelos húmedos en úlceras grado II.
- C) En las heridas con alta carga bacteriana o signos de infección local, se usarán apósitos con plata o apósitos de fibra de poliacrilato de plata, limitando su uso continuado a un máximo de 2 semanas sin reevaluación.
- D) Los hidrogeles en estructura de placa o lámina son la indicación preferente para el rellenado de las cavidades profundas en UPP grado IV con el fin de absorber el exceso de exudado.

**89. ¿Qué disciplina utilizó Florence Nightingale para estudiar sus acciones sanitarias?**

- A) Sociología.
- B) Farmacología.
- C) Estadística.
- D) Psicología.

**90. En relación al uso de las terapias compresivas para el tratamiento de las úlceras de etiología venosa en MMII, señale la opción correcta:**

- A) Los vendajes inelásticos pierden su efectividad terapéutica durante la deambulacion al no adaptarse dinámicamente a la contracción de la musculatura de la pantorrilla.
- B) Los sistemas de compresión multicapa son la elección preferente en pacientes con enfermedad arterial periférica asociada.
- C) Durante la aplicación del vendaje, el paciente debe mantener el pie en flexión plantar máxima y reposará en posición de Anti-Trendelenburg para facilitar la técnica.
- D) El vendaje debe iniciarse desde la raíz de los dedos, incluyendo el talón, aplicándose en técnica de espiral con un solapamiento del 50% y terminando a 2 centímetros del hueco poplíteo.

**91. La pérdida de masa y potencia muscular por envejecimiento o por sedentarismo, que ocurre con el paso de los años se denomina:**

- A) Sarcopenia.
- B) Sacorpenia.
- C) Sarcoidosis.
- D) Sacoirdosis.

**92. Como enfermera en educación para la salud uno de los métodos que podemos usar para ello, son las dinámicas de grupo. Estas pueden ser de diferentes tipos. Señale cuál es una dinámica de grupo:**

- A) El psicodrama.
- B) Tormenta de ideas.
- C) FODA o DAFO.
- D) Todas las respuestas anteriores son tipos de dinámicas de grupo.

**93. Indique la respuesta correcta sobre la definición de un catéter venoso central que van a poner a un paciente ingresado en la UCI:**

- A) Es un catéter que se inserta a través de una vena periférica, habitualmente la vena subclavia, la yugular o una de las extremidades superiores. El catéter se introduce hasta alcanzar la vena cava superior o las cavidades derechas.
- B) Es un catéter que se inserta a través de una vena periférica, habitualmente la vena subclavia, la yugular o una de las extremidades superiores. El catéter se introduce hasta alcanzar las cavidades izquierdas.
- C) Es un catéter que se inserta a través de una vena periférica, preferentemente la vena femoral, la carótida o una de las extremidades superiores. El catéter se introduce hasta alcanzar la vena cava superior o las cavidades derechas.
- D) Es un catéter que se inserta a través de una vena periférica, preferentemente la vena femoral, la carótida o una de las extremidades superiores. El catéter se introduce hasta alcanzar las cavidades izquierdas.

**94. Según Sigmund Freud, ¿cómo se llama la primera etapa psicosexual que se desarrolla desde el nacimiento hasta el primer año de vida aproximadamente?**

- A) Anal.
- B) Fálica.
- C) Oral.
- D) Genital.

**95. Según la Organización Mundial de la Salud y en relación a los DIU, cuál de estas opciones es la verdadera:**

- A) Los DIU liberadores de levonorgestrel pueden usarse como anticonceptivo de urgencia si se insertan dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección.
- B) El DIU de cobre espesa el moco cervical, inhibe el esperma y reduce el grosor del revestimiento del útero.

C) Los DIU proporcionan años de anticoncepción fiable y son adecuados para mujeres en todas las edades, excluyendo las adolescentes nulíparas.

D) Una vez colocado, el DIU presenta unos pequeños hilos que se extienden hacia la vagina. La mujer puede examinar esos hilos para asegurarse de que el dispositivo sigue en su sitio.

**96. ¿Qué tipo de reacción adversa a un medicamento (RAM) está relacionada con el mecanismo de acción es dosis-dependiente y predecible?**

A) Tipo B.

B) Tipo D.

C) Tipo A.

D) Tipo C.

**97. Según el protocolo de cuidados del recién nacido sano en el Servicio Gallego de Salud, ¿cuál de las siguientes actuaciones es correcta respecto al contacto piel con piel?**

A) El peso y la talla deben realizarse en los primeros 15 minutos antes de que el bebé se duerma.

B) La administración de la Vit K (profilaxis antihemorrágica) es una prioridad que debe anteponerse al contacto piel con piel.

C) El test de Apgar ante un recién nacido sano y vigoroso, se realizará manteniendo el contacto piel con piel.

D) En caso de cesárea, el contacto piel con piel está contraindicado por el riesgo de hipotermia.

**98. La Escala validada para evaluar el nivel de conciencia y el estado neurológico de un paciente con una posible lesión cerebral se denomina:**

A) Escala de Glasgow o escala de coma de Glasgow.

B) Escala de Ramsay o escala de coma de Ramsay.

C) Escala de Norton.

D) Escala de Braden.

**99. En un paciente al que se le realiza balance hídrico se observa oliguria lo cual quiere decir que, indique la respuesta correcta:**

A) Existe una disminución de la diuresis por debajo del umbral necesario para mantener la homeostasis.

B) Hay un aumento anormal de la diuresis debido a la excreción de solutos poco reabsorbibles.

C) Hay una anulación de la diuresis.

D) Existe un aumento anormal del número de micciones, aumentando la diuresis diaria total.

100. El consumo o exposición a los productos del tabaco por las mujeres embarazadas no se asocia más específicamente con:

- A) Rotura uterina.
- B) Placenta previa.
- C) Desprendimiento prematuro de placenta.
- D) Bajo peso al nacer.

Preguntas de reserva

**101. Si hablamos de la menopausia y en relación con la terapia hormonal sustitutiva, ¿cuándo debemos añadir progestágenos al tratamiento con estrógenos en mujeres no histerectomizadas?**

- A) Cuando queremos potenciar el efecto de los estrógenos y evitar los sofocos.
- B) Cuando queremos evitar el aumento de peso asociado al tratamiento hormonal.
- C) Cuando buscamos que la paciente sigue teniendo ciclos menstruales regulares.
- D) Cuando buscamos reducir el riesgo de hiperplasia y cáncer de endometrio que podrían provocar los estrógenos.

**102. ¿Qué periodo de ayuno debemos considerar para un lactante con lactancia materna exclusiva que va a sersometido a una prueba diagnóstica bajo sedación?**

- A) Dos horas de ayuno desde la última toma.
- B) Cuatro horas de ayuno.
- C) Seis horas de ayuno.
- D) No es necesario cumplir ayuno para pacientes con lactancia materna exclusiva.

**103. En lo relativo al tratamiento farmacológico en el paciente EPOC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

- A) Los broncodilatadores son el tratamiento farmacológico principal de la EPOC y se divide en dos tipos principales: los betaagonistas y los anticolinérgicos.
- B) Los corticoesteroides inhalados son considerados broncodilatadores.
- C) El formoterol es broncodilatador agonistas beta-2 de acción larga (LABA).
- D) El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico de acción corta.

**104. En relación al tratamiento de la diabetes con metformina, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?**

- A) Puede reducir los niveles de vitamina B12 al disminuir su absorción.
- B) Evitar, en la medida de lo posible, el uso de contrastes yodados.
- C) Estimula la producción de insulina por lo que el riesgo de hipoglucemia es alto al inicio del tratamiento.
- D) Presenta una eficacia alta sobre la disminución de hemoglobina glicosilada (HbA1).

**105. ¿Qué par craneal se encarga de la inervación motora del músculo oblicuo superior del ojo?**

- A) Tercer par craneal (nervio oculomotor)
- B) Quinto par craneal (nervio trigémino)
- C) Cuarto par craneal (nervio troclear)
- D) Sexto par craneal (nervio abducens)

**106. En el marco teórico de la educación para la salud y según el Modelo Transteórico del cambio de Prochaska y DiClemente ¿cuál no es una etapa del proceso de cambio?**

- A) Precontemplación
- B) Contemplación
- C) Negación.
- D) Acción.

**107. ¿Cuáles son las cinco etapas del duelo clásicas descritas por Kübler-Ross?**

- A) Aceptación , resiliencia, depresión, ira y negociación.
- B) Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
- C) Tristeza, rabia, choque, resolución y aceptación.
- D) Resiliencia, depresión, ira, negociación y negación.

**108. ¿A través de que estructura anatómica fluye normalmente el humor acuoso para pasar de la cámara posterior a la cámara anterior del globo ocular?**

- A) A través de la pupila.
- B) A través de la zónula de zinn.
- C) A través del canal de cloquet.
- D) A a través de la esclera.

**109. Uno de los formatos para publicar trabajos de investigación en las revistas de investigación es, indique la respuesta correcta:**

- A) IMRD.
- B) LCFA.
- C) UPP.
- D) HILL.

**110. Una de las alteraciones frecuentes en el anciano es la opacidad parcial o total del cristalino o de su cápsula y se denomina, indique la respuesta correcta:**

A) Glaucoma.

B) Catarata.

C) Presbicia.

D) Retinopatía.